



预防登革热



防蚊灭蚊 清除孳生地

什么是登革热

登革热是由登革病毒引起的急性虫媒传染病。主要通过伊蚊（俗称“花斑蚊”）叮咬传播。

全球来看，登革热主要流行于热带和亚热带地区，尤其是东南亚、非洲、南美洲地区以及环太平洋岛屿。
每年5-11月，是佛山市登革热流行季。



(埃及伊蚊)




(白纹伊蚊)

登革热的症状



热:突发高烧(39℃), 可伴畏寒。



痛:头痛、眼窝痛、肌肉和关节痛, 全身乏力。



红:面部、颈部、胸部潮红。甚至出现眼结膜充血、牙龈出血等。



疹:皮疹分布于四肢躯干或头面部。



其他:恶心、呕吐、腹泻、腹痛。

出现相关症状第一时间到正规医院就诊, 告知医生具体的症状及住家周围是否有人感染登革热的情况。如近期有登革热流行地区旅居史要主动告知医生, 配合开展登革热相关检测。

如何预防登革热


清理家中各种积水, 水生植物3-4天要换水洗瓶一次, 花盆底盘也不要留有积水。

环境治理



楼宇外的露台, 室外的坑洼、树洞、竹筒等积水, 要定期疏通、平洼填坑、翻盆倒罐。

个人防护



室内安装纱门、纱窗, 睡觉时使用蚊帐。外出游玩穿浅色长衣裤, 外露皮肤涂抹驱避剂。

化学防治



用蚊香、驱避剂、气雾杀虫剂等常用化学药物进行杀灭和驱避蚊虫。

物理防治



利用光、声、电等物理方法捕杀、诱杀或驱除蚊虫, 如光诱器、电蚊拍等。

生物防治



在水池、荷花缸放养观赏鱼类, 在稻田、灌溉沟渠放养鲤鱼、草鱼等, 通过放养鱼类消灭蚊幼虫。

一旦诊断为登革热, 请配合当地卫生健康部门, 进行住院隔离治疗。

佛山市疾病预防控制中心



700.00 mm

520.00 mm